

Остановка наружного кровотечения при ранениях



Голова:

- Прямое давление на рану
- Давящая повязка.




Шея:

- Прямое давление на рану
- Давящая повязка через противоположную ране подмышку или Руку.



Грудная клетка, живот и таз:

- Прямое давление на рану
- Давящая повязка.



Конечности:

- Прямое давление на рану
- Давящая повязка
- Жгут

Для остановки кровотечения смежных зон - мест сочленения конечностей и шеи с туловищем - предпочтительно использовать прямое давление на рану.

Способ выбирается в зависимости от интенсивности кровотечения, места ранения, предполагаемого срока прибытия медработников и наличия оснащения. Указанные способы временной остановки кровотечения могут использоваться самостоятельно или в различных комбинациях.



ГАПОУ РБ
«Белебеевский
медицинский колледж»

ОКАЗАНИЕ ПЕРВО
ПОМОЩИ ПРИ
ОСТАНОВКЕ
НАРУЖНОГО
КРОВОТЕЧЕНИЯ
ПРИ РАНЕНИЯХ
РАЗЛИЧНЫХ
ОБЛАСТЕЙ ТЕЛА



Обзорный осмотр



В течение нескольких секунд, поиск интенсивного продолжающегося кровотечения - требует немедленной остановки.

Признаки:

1. Одежда пропитана кровью
2. Много крови на земле
3. Кровь интенсивно вытекает из раны.

Инородное тело в ране




Не двигать его в ране!
Интенсивное продолжающееся кровотечение:
Нет - пострадавший не должен двигаться!

ДА - перейти к наложению кровоостанавливающего жгута.

Если невозможно наложить жгут: обложить края раны и инородное тело бинтами и зафиксировать повязкой.

Способы временной остановки наружного кровотечения



Прямое давление на рану. Сильное давление рукой в перчатке через салфетки, бинт или ткань до остановки кровотечения.

При отсутствии табельных и подручных средств допустимо давление на рану руками в перчатках. Пострадавший может остановить кровотечение в порядке самопомощи путем прямого давления на рану.



Наложение давящей повязки. Фиксация салфетки, бинта или свернутой ткани на ране бинтом. раскатанным с усилием вокруг раневой части. Усиление может осуществляться перекрутами бинта.

Закрепить свободный конец бинта.

Наложение кровоостанавливающего жгута

Наложение кровоостанавливающего жгута в виде эластичной ленты.

Только при кровотечении из конечностей, если невозможно остановить его другими способами.

- Поверх ткани
 - Между раной и сердцем 5-7 см от раны
 - Максимально растянуть за конечностью и первым туром остановить кровотечение
 - Каждый последующий тур наполовину перекрывает предыдущий
 - Жгут должен быть виден
 - Зафиксировать время наложения
- Относительно безопасный срок наложения жгута на конечность - 2 часа.

